Algebarska struktura grupa

Galiot, Nataša

Undergraduate thesis / Završni rad

2017

Degree Grantor / Ustanova koja je dodijelila akademski / stručni stupanj: **Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, Department of Mathematics / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Odjel za matematiku**

Permanent link / Trajna poveznica: https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:126:279155

Rights / Prava: In copyright / Zaštićeno autorskim pravom.

Download date / Datum preuzimanja: **2024-03-28**



Repository / Repozitorij:

Repository of School of Applied Mathematics and Computer Science







Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Sveučilišni preddiplomski studij matematike

Nataša Galiot

Algebarska struktura grupa

Završni rad

Osijek, 2017.

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku
Odjel za matematiku
Preddiplomski studij matematike

Nataša Galiot

Algebarska struktura grupa

Završni rad

Voditelj: izv.prof.dr.sc. Ivan Matić

Osijek, 2017.

Sažetak. U ovom radu pisat ćemo o algebarskoj strukturi grupa. U uvodu ćemo navesti definiciju grupe, njezina osnovna svojstva te pojmove poput Abelova grupa, podgrupa, homomorfizam i izomorfizam grupa.
Nadalje, u drugom dijelu opisat ćemo nekoliko različitih vrsta grupa počevši s normalnim i kvocijentnim grupama u sklopu kojih ćemo iskazati i dokazati Lagrangeov teorem i prvi teorem o izomorfizmu. Sljedeće ćemo opisati cikličke i na kraju p-grupe uz koje vežemo i pojam Sylowljevih p-grupa, Cauchyjev teorem te tri Sylovljeva teorema.

Ključne riječi: grupa, Abelova grupa, podgrupa, homomorfizam, izomorfizam, normalne grupe, kvocijentne grupe, cikličke grupe, p-grupe, Lagrangeov teorem, prvi teorem o izomorfizmu, Cauchyjev teorem, Sylowljevi teoremi

Abstract. In this term paper we will write about algebraic structure group. In Introduction we will cite the definition of a group, it's elementary characteristics and terms as Abelian group, subgroup, homomorfism and isomorfism of group.
Furthermore, in second part we'll describe few different type of groups starting with normal and quotient/factor groups within which we will state and prove Lagrange's theorem and first theorem of isomorfism. Next we will describe cyclic and at the end p-groups with which we associate the term of Sylow-s p-groups, Cauchy's theorem and three Sylow's theorems.

Key words: group, Abelian group, subgroup, homomorfism, isomorfism, normal groups, quotient / factor groups, cyclic groups, p-groups, Lagrange's theorem, first theorem of isomorfism, Cauchy's theorem, Sylow's theorems.

Sadržaj

1 Uvod **4**

2 Posebni oblici grupa **8**

2.1 Normalne i kvocijentne podgrupe 8

2.2 Cikličke grupe 12

2.3 p-grupe 13

3 Primjena **15**

1 Uvod

Promatrat ćemo parove koji se sastoje od skupa i binarne operacije definirane na tom skupu. Započnimo sa osnovnom definicijom grupe i njezinim svojstvima.

Definicija 1.1. *Neka je G neprazan skup na kojem je definirana binarna operacija $* : G \to G$. Kažemo da je G grupa ukoliko vrijede sljedeća svojstva:*

1. *Zatvorenost: Za svaki $a, b \in G$ vrijedi*

$$ab \in G$$

2. *Asocijativnost: Za svaki $a, b, c \in G$ vrijedi*

$$(ab)c = a(bc)$$

3. *Postojanje neutralnog elementa: Postoji element $1 \in G$, koji nazivamo neutralni element (jedinica grupe), takav da za svaki $a \in G$ vrijedi*

$$1a = a \text{ (lijeva jedinica)}$$
$$a1 = a \text{ (desna jedinica)}$$

4. *Postojanje inverznog elementa: Za svaki $a \in G$ postoji element $a^{-1} \in G$ koji nazivamo inverz elementa a za koji vrijedi*

$$aa^{-1} = 1 \text{ (desni inverz)}$$
$$a^{-1}a = 1 \text{ (lijevi inverz)}$$

Za elemente $a, b \in G$ kažemo da su komutativni, tj da komutiraju ukoliko je $ab = ba$.

Za pojam komutativnosti vezan je pojam Abelove grupe. Grupa je Abelova ako svaki par elemenata iz grupe komutira. Konačna je ukoliko je skup G konačan, a u suprotnom je beskonačna. Uobičajeno je govoriti „G je grupa“ iako je G skup, ali se podrazumijeva da je tada skupu G pridružena binarna operacija.

Primjer 1.2. *(a) Najjednostavniji primjer grupe je trivijalna grupa $G = \{1\}$ koja sadrži neutralni element.*

(b) Skup $K_4 = \{1, -1, i, -i\}$ na kojem je definirano množenje je Abelova grupa.
Provjerimo vrijede li svojstva iz definicije grupe i da li elementi skupa K_4 komutiraju.

- *Zatvorenost: Je li za svaka dva elementa $a, b \in K_4$ i $ab \in K_4$? Odgovor je potvrdan.*

•	1	-1	i	-i
1	1	-1	i	-i
-1	-1	1	-i	i
i	i	-i	-1	1
-i	-i	i	1	-1

- *komutativnost: Uočljivo je iz prethodne tablice kako je $ab = ba$ za svaka dva elementa $a, b \in K_4$*
- *asocijativnost: Vrijedi li $(ab)c = a(bc)$ za svaka tri elementa $a, b, c \in K_4$?*

$$(1(-1))i = 1((-1)i)$$

$$(1(-1))(-i) = 1(-1(-i))$$
$$(1(-i))i = 1((-i)i)$$
$$((-1)1)(-i) = -1(1(-i))$$
$$(-1(-i))i = -1((-i)i)$$
$$((-1)1)i = -1(1i)$$
$$(i(-1))1 = i((-1)1)$$
$$(i(-1))(-i) = i(-1(-i))$$
$$(i1)(-i) = i(1(-i))$$

Pokazali smo kako K_4 zadovoljava i ovaj aksiom grupe.

- *Postojanje neutralnog elementa: Tražimo element $e \in K_4$ takav da je za svaki $a \in K_4$ $ae = a$. Prema tome, $e = 1$, $1 \in K_4$, je neutralni element.*
- *Postojanje inverznog elementa: Postoji desni inverz u skupu K_4, a kako su elementi u tom skupu komutativni, slijedi kako općenito postoji inverzni element u tom skupu.*

$$ab = e$$

$$ab = 1$$

$$1 \cdot 1 = 1$$

$$-1(-1) = 1$$

$$i(-i) = 1$$

$$(-i)i = 1$$

Iz navedenoga slijedi kako je K_4 Abelova grupa.

Nadalje, ako je a element grupe, tada se svaki cijeli broj n sa svojstvom da je $a^n = 1$ naziva se eksponent elementa a. Ukoliko a nema eksponenta, kažemo da je beskonačnog reda. Red grupe G, koji označavamo sa $|G|$ ili $o(G)$, je broj elemenata u skupu G.

Definicija 1.3. *Neka je G grupa i H podskup od G. H se naziva podgrupa grupe G ako je H grupa obzirom na istu operaciju kao i G. Pišemo $H \leq G$.*

Svaka grupa ima najmanje dvije podgrupe: 1 i G. Činjenicu da je skup H podgrupa grupe G lako pokazujemo pomoću sljedećeg teorema.

Teorem 1.4. *Neka je H podskup od G te H neprazan skup. H je podgrupa od G ako i samo ako za sve $a, b \in H$ vrijedi $ab^{-1} \in H$.*

Dokaz. Pretpostavimo prvo kako je H podgrupa od G. Prema tome postoje $a, b^{-1} \in H$, a kako vrijedi svojstvo zatvorenosti u odnosu na danu operaciju, slijedi da je $ab^{-1} \in H$. Pretpostavimo sada kako je $ab^{-1} \in H$ za svaki $a, b \in H$. S obzirom da je H neprazan skup, u njemu postoji neki element $a \in H$. Tada je i $aa^{-1} = 1 \in H$. Dakle, H sadrži neutralni element. Također, za svaki $b \in H$ vrijedi $eb^{-1} = b^{-1} \in H$ pa zaključujemo kako postoji i inverzni element. Nadalje, za elemente $a, b \in H$ je i $b^{-1} \in H$ pa je isto tako i $a(b^{-1})^{-1} = ab \in H$, odnosno H je zatvoren u odnosu na danu operaciju. Svojstvo asocijativnosti je naslijeđeno iz G. Prema tome, H je grupa. □

Primjer 1.5. *Ponekad kada želimo pokazati kako je neki skup grupa, može nam biti lakše pokazati kako je dani skup podgrupa neke grupe nego posebno provjeravati svaki od aksioma grupe.*
Pogledajmo je li $(S_1, \cdot)$ grupa, pri čemu je $S_1 = \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1\}$. Umjesto da provjeravamo svaki od aksioma grupe, pokušat ćemo pokazati da je S_1 podgrupa neke grupe. Uzmimo na primjer grupu $\mathbb{C}^*$. Kako je z kompleksan broj, možemo ga zapisati u sljedećem obliku:

$$z = |z|(\cos t + i \sin t), t \in \mathbb{R}$$

$$= |z|e^{it}, t \in \mathbb{R}.$$

Prema tome, S_1 ima oblik $S_1 = \{e^{it} : t \in \mathbb{R}\}$. Tvrdimo da je $S_1 \leq \mathbb{C}^*$. S_1 je svakako podskup od $\mathbb{C}^*$ jer su neki kompleksni brojevi podskup svih kompleksnih brojeva. Također je neprazan skup jer je barem $1 \in S_1$. Uzmimo sada dva elementa z_1, z_2 iz S_1 oblika $z_1 = e^{it_1}$, $z_2 = e^{it_2}$, za realne brojeve t_1 i t_2. Tada je:

$$z_1 z_2^{-1} = e^{it_1} e^{-it_2} = e^{i(t_1 - t_2)} \in S_1.$$

Iz toga prema prethodno dokazanom teoremu slijedi kako je S_1 podgrupa od $\mathbb{C}^*$, a iz definicije podgrupe slijedi kako je S_1 upravo grupa.

Sljedeća dva važna pojma u teoriji grupa su homomorfizam i izomorfizam grupa. Neka su G_1 i G_2 grupe. Preslikavanje $\varphi : G_1 \to G_2$ naziva se homomorfizam grupa ako za svaki $a, b \in G_1$ vrijedi

$$\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b).$$

Kažemo da je grupa G_1 izomorfna grupi G_2 ako postoji izmorfizam (bijektivno preslikavanje) $\varphi : G_1 \to G_2$.

Primjer 1.6. *Pokažimo da je preslikavanje $f(x) = i^x$ homomorfizam grupe $(\mathbb{Z}, +)$ u grupu $(K_4, \cdot)$. Neka su x i y iz skupa cijelih brojeva. Trebamo provjeriti vrijedi li:*

$$f(x + y) = f(x)f(y).$$

Izračunom lijeve i desne strane dobijemo

$$f(x+y) = i^{x+y}$$

$$f(x)f(y) = i^x i^y = i^{x+y}.$$

Kako su desne strane obje jednakosti jednake, zaključujemo kako je f homomorfizam.

Bitno je spomenuti i sliku i jezgru grupe. Pretpostavimo li kako je preslikavanje $\varphi : G_1 \to G_2$ homomorfizam grupa, tada stavljamo:
$Im\varphi = \{\varphi(a) : a \in G_1\} \leq G_1$ je slika od φ,
$Ker\varphi = \{a \in G_1 : \varphi(a) = e_{G_2}\} \leq G_1$ je jezgra od φ.

2 Posebni oblici grupa

Iako postoji više različitih oblika grupa, u ovom radu opisat ćemo normalne, kvocijentne, cikličke i p-grupe te navesti važnija svojstva, pojmove i teoreme vezane za njih.

2.1 Normalne i kvocijentne podgrupe

Neka je H podgrupa grupe G te neka su $a, b \in G$. Kažemo da je element a desno kongruentan b modulo H ukoliko je $b^{-1}a \in H$. Oznaka je $a \sim^H b$ Analogno se definira i relacija „biti lijevo kongruentan modulo H“ koju označavamo sa $a^H \sim b$. Promotrimo tu relaciju na sljedećem primjeru.

Primjer 2.1. *$n\mathbb{Z}$ je podgrupa grupe $\mathbb{Z}$ uz zbrajanje za prirodan broj n pa stoga je i $6\mathbb{Z}$ podgrupa grupe $\mathbb{Z}$. Neka su $a, b \in \mathbb{Z}$. a je desno kongruentno b modulo $6\mathbb{Z}$ ako i samo ako je $-b + a \in 6\mathbb{Z}$ a to pak vrijedi ako i samo ako je $a = b \pmod 6$.*

„Biti desno kongruentan modulo H“ je relacija ekvivalencije na G i to se jednostavno provjeri ispitivanjem svojstava ekvivalentnosti:

- Refleksivnost: Za $a \in G$ $a \sim^H a$ jer je $a^{-1}a = e \in H$
- Simetričnost: Za $a, b \in G$ takve da je $a \sim^H b$ vrijedi $b^{-1}a \in H$ iz čega slijedi da je $(b^{-1}a)^{-1} = a^{-1}(b^{-1})^{-1} = a^{-1}b \in H$ pa je prema tome $b \sim^H a$.
- Tranzitivnost: Neka su $a, b, c \in G$ takvi daje $a \sim^H b$ i $b \sim^H c$. Tada je $b^{-1}a \in H$ i $c^{-1}b \in H$, odnosno $(c^{-1}b)(b^{-1}a) = c^{-1}(bb^{-1})a = c^{-1}a \in H$, a to znači da je $a \sim^H c$.

Ukoliko s $[a]$ označimo klasu ekvivalencije elemenata $a \in G$, tada je

$$[a] = \{ah : h \in H\} = aH$$

te tu klasu nazivamo desna H-klasa u grupi G. Analogno se definira i lijeva H-klasa. Grupa G je disjunktna unija svih svojih desnih H-klasa. Uz ove pojmove vežemo Lagrangeov teorem koji nam govori o redu grupe G i njezine podgrupe H, ali prije iskaza i dokaza navedenog teorema, promotrimo lemu koja će nam koristiti u dokazu teorema.

Lema 2.2. . *Neka je G grupa i H podgrupa od G. Tada je*

$$|aH| = |Ha| = |H| \text{ za svaki } a \in G.$$

Dokaz. Trebamo pokazati kako su redovi od aH, Ha i H jednaki. Promatrat ćemo preslikavanja $f : Ha \to H$ i $g : aH \to H$ dana sa $f(ha) = h$ i $g(ah) = h$ te pokazati da su bijektivna. Oba su očito surjektivna jer se za h iz H elementi ah i ha preslikaju u njega. Uzmimo sada elemente h_1a i h_2a iz Ha koji se preslikaju u isti element iz H.

$$f(h_1a) = h_1$$

$$f(h_2a) = h_2$$

Kako je po pretpostavci $h_1 = h_2$, slijedi da je i $h_1a = h_2a$ pa je f injektivno preslikavanje, a analogno se pokaže kako je i g injektivno preslikavanje. □

Teorem 2.3 (Lagrangeov teorem)**.** *Neka je G konačna grupa i H njezina podgrupa. Tada je red od G djeljiv redom od H, tj $|H|$ dijeli $|G|$. Točnije, ako označimo $|G| = n$ i $|H| = k$, a sa p označimo broj desnih, odnosno lijevih H-klasa u G, tada je $n = pk$.*

Dokaz. Neka su $a_1, a_2, \ldots a_p$ predstavnici svih desnih H-klasa u G. Kako znamo da je G disjunktna unija svojih desnih H-klasa, možemo pisati:

$$G = a_1H \cup a_2H \cup \ldots \cup a_pH.$$

Prema tome vrijedi da je

$$|G| = |a_1H| + |a_2H| + \ldots + |a_pH|.$$

Iskoristimo li prethodnu lemu, dobijemo kako je

$$|G| = |H| + |H| + \ldots + |H| = p|H|.$$

Iz tog rezultata slijedi tvrdnja teorema. □

Primjer 2.4. *(a) Neka je G grupa prostog reda kojeg ćemo označiti za n i H podgrupa od G. Prema prethodnom teoremu $|H|$ dijeli $|G|$, a kako su jedini djelitelji prostog broja n jedinica i on sam, to znači kako su mogući redovi podgrupe H iz skupa $\{1, n\}$, odnosno, $H = \{e\}$ ili $H = G$. Iz ovog primjera zaključujemo kako grupa prostog reda ima samo trivijalne podgrupe.*

(b) Neka je G grupa reda 8 i H podgrupa od G. Tada je $|H| \in \{1, 2, 4, 8\}$.

Za podgrupu H grupe G kažemo da je podgrupa konačnog indeksa u grupi Gako ima samo konačno mnogo desnih H-klasa u G. Taj broj desnih H-klasa označavamo sa $[G : H]$ i nazivamo indeks od H u G. U slučaju da je G konačna grupa, tada je red od G jednak umnošku indeksa od H u G i reda podgrupe H.

Definicija 2.5. . *Podgrupa H grupe G naziva se normalna podgrupa u oznaci $H \trianglelefteq G$ ukoliko za svaki element $c \in G$ vrijedi*

$$Hc = cH \text{ , to jest } \{hc : h \in H\} = \{ch : h \in H\}.$$

Navedimo sada dva primjera.

Primjer 2.6. *Svaka podgrupa Abelove grupe je normalna.*

Primjer 2.7. *Pokažimo da je $SL_n(R)$ normalna podgrupa od $GL_n(R)$. Znamo kako je $SL_n(R)$ podgrupa od $GL_n(R)$. Uzmimo sada $A \in SL_n(R)$ i $B \in GL_n(R)$. Vrijedi sljedeće:*

$$\begin{aligned}\det(BAB^{-1}) &= \det(B)\det(A)\det(B^{-1}) \\ &= \det(B)\det(B^{-1}) \\ &= 1.\end{aligned}$$

Znači, $BAB^{-1} \in SL_n(R)$ pa je $SL_n(R)$ normalna podgrupa od $GL_n(R)$.

Kako bismo definirali kvocijentnu grupu grupu grupe G po normalnoj podgrupi H, promotrimo najprije sljedeće.
Neka je H normalna podgrupa grupe G. Označimo sa G/H skup svih H-klasa u grupi G te na tom skupu ćemo definirati binarnu operaciju zadanu na sljedeći način:

$$(aH)(bH) = abH \text{ , pri čemu su } a, b \in H.$$

Provjerimo je li navedena operacija dobro definirana, to jest da ne ovisi o izboru reprezentanata a i b. U tu svrhu izaberimo $a', b' \in H$ takve da je

$$aH = a'H \;\; a \sim^H a'$$
$$bH = b'H \;\; b \sim^H b'.$$

Trebamo pokazati da izrazi $(aH)(bH) = abH$ i $(a'H)(b'h) = a'b'H$ daju jednake rezultate, odnosno povlači li $a \sim^H a'$ i $b \sim^H b'$ da je također $ab \sim^H a'b'$. Prema pretpostavci je $a \sim^H a'$, to jest $a^{-1}a' \in H$ pa možemo odabrati element h_1 iz podgrupe H i označiti $a^{-1}a' = h_1$. Pomnožimo li jednakost s a, dobijemo kako je $a' = ah_1$. Analogno slijedi iz $b \sim^H b$ da je $b' = bh_2$, pri čemu je $h_2 \in H$. Nadalje, iskoristit ćemo činjenicu da je H normalna pogrupa od G. Tada je

$$b^{-1}/Hb = bH$$
$$b^{-1}Hb = H$$
$$b^{-1}h_1b \in H.$$

Promotrimo sada umnožak $a'b'$.

$$a'b' = ah_1bh_2$$
$$= aeh_1bh_2$$
$$= abb^{-1}h_1bh_2$$
$$= ab(b^{-1}h_1b)h_2.$$

Ovdje ćemo iskoristiti prethodni rezultat i označiti:

$$b^{-1}h_1b = h_3$$
$$= abh_3h_2, h_3, h_2 \in H.$$

Kako su h_3 i h_2 elementi podgrupe H, možemo njihov umnožak označiti sa h_4 koji se također nalazi u H pa imamo $a'b' = abh_4$. Sada je preostalo pomnožiti izraz sa $(ab)^{-1}$.

$$(ab)^{-1}a'b' = h4 \in H$$

Iz toga proizlazi kako je $ab \sim^H a'b'$ i $abH = a'b'H$ te je skup G/H grupa.

Definicija 2.8. . *G/H naziva se kvocijentna grupa grupe G po normalnoj podgrupi H.*

Teorem 2.9. *Neka je $\varphi : G_1 \to G_2$ homomorfizam grupa.*

(i) $Ker\varphi$ je normalna podgrupa od G_1.

(ii) (Prvi teorem o izomorfizmu)
Preslikavanje $\Phi : G_1/Ker\varphi \to Im\varphi$ definirano izrazom

$$\Phi(aKer\varphi) = \varphi(a), a \in G_1$$

je izomorfizam kvocijentne grupe $G_1/Ker\varphi$ na grupu $Im\varphi$.

Dokaz. Dokaz prvog dijela ovog teorema se svodi na korištenje činjenice kako je preslikavanje φ homomorfizam i promatranje djelovanja navedenog preslikavanja na element $a^{-1}ha$, pri čemu je $a \in G_1$, $h \in Ker\varphi$.
Dokaz prvog teorema o izomorfizmu je također veoma jednostavan. Prvo je potrebno pokazati kako je preslikavanje $\Phi(aKer\varphi) = \varphi(a)$ dobro definirano što ćemo pokazati odabirom nekog drugog reprezentanta i pokazivanjem da to ne utječe na rezultat.
Neka je

$$aKer\varphi = a'Ker\varphi.$$

Iz $a \sim^{Ker\varphi} a'$ slijedi da je $a^{-1}a' \in Ker\varphi$, tj. $a^{-1}a' = h, h \in Ker\varphi$. Neka je

$$\Phi(aKer\varphi) = \varphi(a),$$
$$\Phi(a'Ker\varphi) = \varphi(a'),$$
$$a' = ah \text{ za neki } h \in Ker\varphi.$$

Prema tome vrijedi

$$\Phi(a'Ker\varphi) = \varphi(a') = \varphi(ah) = \varphi(a)\varphi(h) = \varphi(a) = \Phi(aKer\varphi)$$

pa je to preslikavanje dobro definirano. Nadalje, kako bismo pokazali da je izomorfizam, moramo pokazati da je homomorfizam i bijekcija.

- Homomorfizam:
  $\Phi((aKer\varphi)(bKer\varphi)) = \Phi(abKer\varphi) = \varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) = \Phi(aKer\varphi)\Phi(bKer\varphi)$
- Surjektivnost: Budući da je kodomena preslikavanja jednaka slici od φ, iz same definicije preslikavanja Φ slijedi da je ono surjekcija.
- Injektivnost:

$$\Phi(aKer\varphi) = \Phi(bKer\varphi)$$
$$\varphi(a) = \varphi(b)/\varphi(b)^{-1}$$
$$\varphi(a)\varphi(b)^{-1} = e_{G_2}$$
$$\varphi(a)\varphi(b^{-1}) = e_{G_2}$$
$$\varphi(ab^{-1}) = e_{G_2}$$
$$ab^{-1} \in Ker\varphi$$
$$Ker\varphi \trianglelefteq G_1$$
$$\Rightarrow a \sim^{Ker\varphi} b$$
$$\Rightarrow aKer\varphi = bKer\varphi.$$

Prema tome, tvrdnja teorema vrijedi. □

Podskup grupe G u oznaci $Z(G) = \{x \in G : ax = xa, \text{ za svaki } a \in G\}$ naziva se centar grupe. On je normalna komutativna podgrupa od G, a ako je H podgrupa od G takva da je ujedno i podskup centra grupe, tada je H normalna podgrupa od G i takva podgrupa se naziva centralna.

2.2 Cikličke grupe

Kako bismo definirali cikličke grupe, najprije moramo reći što je grupa generirana skupom S. Promotrimo grupu G za koju ćemo označiti:

$$a^0 = e$$

$$a^1 = a$$

$$a^2 = aa$$

pri čemu je $a \in G$. Za $n \geq 3$ stavimo da je

$$a^n = aa^{n-1},$$

a za $n < 0$, $n \in \mathbb{Z}$ stavimo

$$a^n = (a^{-1})^{-n}.$$

Na taj smo način definirali sve potencije a^n elementa a za cjelobrojne n. Nadalje, neka je preslikavanje $\Phi_a : \mathbb{Z} \to G$ određeno izrazom

$$\Phi_a(n) = a^n.$$

Kako za cjelobrojne m i n vrijedi da je

$$\Phi_a(m+n) = a^{m+n} = a^n a^m = \Phi_a(n)\Phi_a(m),$$

slijedi da je Φ_a homomorfizam grupa. Sada definiramo $< a >$ kao sliku preslikavanja Φ_a, odnosno skup svih a^n za cjelobrojne brojeve n. Taj skup je najmanja podgrupa od G koja sadrži element a. Općenito, neka je S neprazan podskup grupe G. Za najmanju podgrupu od G koja sadrži S kažemo da je generirana sa S i pišemo $< S >$.

Definicija 2.10. *Grupa generirana jednim elementom naziva se ciklička grupa.*

U kontekstu cikličkih grupa, red $| < a > | = m$ naziva se period ili red elementa a te ukoliko $< a >$ nije konačna, element a nije konačnog reda. Neutralni element (jedinica) jedini je element reda 1. Ukoliko je a element reda m u konačnoj grupi G, tada red elementa a dijeli red od G. Prema tome, ako je G prostog reda i a njezin element različit od neutralnog elementa tada je $< a >= G$ iz čega možemo zaključiti kako je grupa prostog reda ciklička.
U ovom dijelu ćemo još samo pokazati kako je svaka podgrupa cikličke grupe G također ciklička i kako je za svaku podgrupu H od G kvocijentna grupa G/H ciklička.

Dokaz. U slučaju da je G beskonačna grupa, ona je izomorfna skupu cijelih brojeva, a to znači da je svaka podgrupa od G izomorfna ili $\{0\} =< 0 >$ ili $m\mathbb{Z} =< m >$ pa je stoga ciklička.
Slično tome, svaka kvocijentna grupa grupe G je izomorfna ili $\mathbb{Z}/\{0\} = \mathbb{Z} =< 1 >$ ili $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ (koja je izomorfna $\mathbb{Z}m =< 1 >$) pa je ciklička.
S druge pak strane, neka je G konačna grupa reda n i $G =< a >$ te označimo sa H podgrupu od G koja ne sadrži samo neutralni element. Tada postoji element $a^m \in H$ za prirodni broj m. Neka je m najmanji takav za koji to vrijedi, to jest $m = \min\{k \in N : a^k \in H\}$. Ono što tvrdimo jest da je $H =< a^m >$ za $a^m \in H$. Tada je $< a^m >$ podskup od H. Uzmimo neki element b iz podgrupe H. Taj element se nalazi i u grupi G, odnosno vrijedi sljedeće:

$$b \in G = \{e, a, a^2, \ldots, a^{n-1}\} \text{ te je } b = a^k \text{ za } 0 \leq k \leq n-1.$$

Nadalje, označimo li s $k = sm + j$, pri čemu je $0 \leq j \leq m$ dobijemo sljedeće:

$$b = a^{sm+j} = a^{sm}a^j/a^{-(sm)}$$

$$ba^{-sm} = a^j$$

$$b(a^m)^{-s} = a^j.$$

Promotrimo li posljednji izraz uočavamo kako iz činjenice da su b i a^m elementi podgrupe H možemo zaključiti kako je i a^j element iz H. Zbog činjenice da je j strogo manji od m slijedi da je $j = 0$ te

$$b = a^{sm} = (a^s)^m \in < a^m >$$

. U konačnici to znači da je H podskup od $< a^m >$ pa je $H =< a^m >$, čime je dokazan prvi dio tvrdnje.
Pretpostavimo li kako je H podgrupa od G, a znamo kako element a generira grupu G, tada klasa aH generira kvocijentnu grupu G/H, to jest G/H je ciklička grupa. □

Primjer 2.11. *Dokažimo kako grupa* $(\mathbb{Q}, +)$ *nije ciklička grupa.*
Pretpostavimo suprotno, to jest da postoje relativno prosti brojevi $m \in \mathbb{Z}$, $n \in \mathbb{N}$ *takvi da je*

$$q =< \frac{m}{n} > .$$

Tada za svaki $q \in \mathbb{Q}$ *postoji* $k \in \mathbb{Z}$ *takav da vrijedi*

$$q = \frac{km}{n}.$$

Uzmimo na primjer

$$q = \frac{1}{2n}.$$

Iz toga slijedi da je

$$\frac{1}{2n} = k\frac{m}{n},$$

odnosno da je

$$km = \frac{1}{2},$$

a to nije moguće jer su k *i* m *cijeli brojevi.*

2.3 p-grupe

Konačnu grupu reda p^n, pri čemu je p prost broj i $n$prirodan, nazivamo p-grupom. Podgrupa H konačne grupe G je p-podgrupa ukoliko je H p-grupa. Primjerice, grupa reda 60 nije p-grupa, dok grupa reda $9 = 3^2$ jest. Jedna pak posebna vrsta p-grupa su Sylowljeve p-podgrupe čiju ćemo definiciju sljedeću iskazati.

Definicija 2.12. *Podgrupa* H *konačne grupe* G *zove se Sylowljeva* p*-podgrupa ako je* H p*-podgrupa i ako indeks* $[G : H]$ *nije djeljiv s* p*.*

Prije iskaza samih Sylowljevih teorema, spomenimo i Cauchyjev teorem. On kaže kako kad imamo konačnu grupu G i p prost broj koji dijeli red grupe G, tada grupa G sadrži podgrupu reda p. Drugim riječima, grupa G tada sadrži element reda p.

Teorem 2.13 (Prvi Sylowljev teorem). *Neka je G grupa reda $p^n m$, gdje su $n \geq 1$ i p prost broj takav da je $(p, n) = 1$. Tada G sadrži podgrupu reda p^i za svaki $1 \leq i \leq n$ i svaka podgrupa od G reda p^i za $i < n$ je normalna u nekoj podgrupi reda p^{i+1}.*

Teorem 2.14 (Drugi Sylowljev teorem). *Neka je G konačna grupa i p prost broj koji dijeli red od G.*

(i) Svaka p-podgrupa grupe G sadržana je u nekoj Sylowljevoj p-podgrupi grupe G.

(ii) Sve Sylowljeve p-podgrupe grupe G su međusobno konjugiranje. Drugim riječima, ako su H i K dvije Sylowljeve p-podgrupe grupe G, tada postoji $a \in G$ takav da je $K = aHa^{-1}$.

Teorem 2.15 (Treći Sylowljev teorem). *Neka je G konačna grupa i neka je p prost broj koji dijeli red od G. Broj Sylowljevih p-podgrupa grupe G dijeli red od G. Broj Sylowljevih p-podgrupa grupe G dijeli $|G| = n$. Također, broj Sylowljevih p-podgrupa grupe G oblika je $kp + 1$ za neki nenegativan cijeli broj k.*

Primjer 2.16. *Ukoliko je red grupe G jednak $15 = 3 \cdot 5$, tada postoji Sylowljeva 3-podgrupa i Sylowljeva 5-podgrupa.*

Primjer 2.17. *Pokažimo kako je konačna grupa G p-grupa ako i samo ako je red svakog elementa grupe G potencija broja p.*
Pretpostavimo najprije kako je G p-grupa, to jest neka postoji prirodan broj k takav da je $|G| = p^k$. Prema Lagrangeovom teoremu $|a| = | < a > |$ i on dijeli red od G, odnosno p^k. Dakle, red od a je oblika p^l pri čemu je l manje ili jednako od k za svaki a iz grupe G, a to upravo znači kako je red svakog elementa od G potencija broja p.
S druge pak strane, pretpostavimo kako je red svakog elementa grupe G potencija broja p. Također, pretpostavimo da G nije p-grupa, to jest kako ne postoji prost broj q različit od p takav da q dijeli red od G. Cauchyjev teorem kaže kako G sadrži element reda q, a to nije moguće pa je G p-grupa.

U ovom poglavlju spomenimo još samo pojam proste grupe. Grupa G zove se prosta ako su jedine njezine normalne podgrupe $\{e\}$ i G, to jest ako nema netrivijalnih normalnih podgrupa.

Primjer 2.18. *Grupa reda 12 nije prosta. Broj 12 možemo zapisati kao umnožak $2^2 3$. Prema trećem Sylowljevom teoremu broj Sylowljevih 3-podgrupa je oblika $3k + 1$ i $3k + 1$ dijeli 12. Uzmimo sada različite brojeve k i pogledajmo što dobijemo.*
$k = 0 \to 3k + 1 = 1$, *1 dijeli* 12
$k = 1 \to 3k + 1 = 4$, *4 dijeli* 12
$k = 2 \to 3k + 1 = 7$, *7 ne dijeli* 12
$k = 3 \to 3k + 1 = 10$, *10 ne dijeli* 13
$k = 4 \to 3k + 1 = 13$, *13 ne dijeli* 12
Stat ćemo kod $k = 4$ jer smo dobili broj veći od 12 pa nema smisla nastavljati postupak. Uočavamo kako je $k = 0$ ili $k = 1$. Ako je $k = 0$, postoji jedinstvena Syowljeva 3 – podgrupa pa je ona normalna. Pretpostavimo da je $k \neq 0$, odnosno da je $k = 1$. Tada postoje četiri Sylowljeve 3-podgrupe reda 3, to jest imamo 8 elemenata reda 3. Preostala četiri elementa tvore grupu reda 4 i to je jedinstvena Sylowljeva 2-podgrupa pa je normalna. Dakle, grupa reda 12 nije prosta.

3 Primjena

Teorija grupa ima široku primjenu ne samo u matematici, već i u drugim znanostima poput fizike, kemije i računarstva, ali i u umjetnosti. Primjerice, u glazbenoj umjetnosti grupu $\mathbb{Z}_{12}$ možemo povezati s činjenicom kako od srednjeg tona C do idućeg tona C na klaviru postoji 12 tipki. Kako ljudsko uho prirodno čuje frekvencije s 12 intervala među njima, možemo slikovito reći da ljudi čuju u aritmetici modulo 12. Kako bismo primijenili matematiku na ovu činjenicu potrebno je samo definirati preslikavanje između kompletiranog niza od 12 nota (kromatske ljestvice) i elemenata grupe $\mathbb{Z}_{12}$. „To činimo na sljedeći način:

$$C \mapsto\mapsto 0, C\sharp \mapsto \sharp \mapsto 1, D \mapsto\mapsto 2, D\sharp \mapsto \sharp \mapsto 3, E \mapsto\mapsto 4,$$
$$F\sharp \mapsto \sharp \mapsto 5, F \mapsto\mapsto 6, G \mapsto\mapsto 7, G\sharp \mapsto \sharp \mapsto 8, A \mapsto\mapsto 9,$$
$$A\sharp \mapsto \sharp \mapsto 10, B \mapsto\mapsto 11$$

Sada je lako zapisati na primjer C-dur ljestvicu: $\{C, D, E, F, G, A, B\} = \{0, 2, 4, 5, 7, 9, 11\}$ [2]."

Drugi zanimljiv primjer uporabe teorije grupa odnosi se na veoma popularnu trodimenzionalnu mehaničku igračku koju je 1974. godine izumio kipar i profesor arhitekture Ernő Rubik te ju nazvao „Čarobna kocka“, a koju danas poznajemo pod imenom Rubikova kocka. Označimo sa G skup svih mogućih poteza koje možemo napraviti na Rubikovoj kocki, a s$*$ preslikavanje koje ćemo nazvati „uzastopno izvođenje poteza“ pri čemu potezom smatramo zaokret jedne od njezinih strana u smjeru kazaljke na satu za 90 stupnjeva. Promotrimo ima li ova struktura svojstva grupe. Operacija $*$ je asocijativna, neutralni potez pri kojem nije promijenjen izgled kocke nazivamo neutralnim elementom. Nadalje, svaki potez je invertibilan (jednostavnim okretanjem kocke u položaj iz kojeg smo je pomaknuli). Dakle, $(G, *)$ je grupa koju nazivamo grupom Rubikove kocke, ali uočimo kako ta grupa nije Abelova. Njezin red je jednak broju svih mogućih poteza koje je moguće na njoj napraviti i iznosi $43 \cdot 10^{18}$, a red elementa pak govori koliko je puta potrebno izvršiti neki potez kako bi se izgled kocke vratio u prvobitni položaj. Uz pomoć teorije grupa moguće je odrediti algoritam za njezino slaganje.

Govoreći u širom spektru, teorija grupa je studija simetrije i pomaže nam u analizi simetričnih objekata – što se može odnositi na geometrijsku strukturu, fizikalne zakonitosti, kemijske strukture, ali i apstraktnije pojmove poput trigonometrijskih funkcija.

Literatura

[1] M. Benko, Grupa Rubikove kocke, Diplomski rad, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb, 2015.

[2] M. Karaga, A. Petrovečki, Primjena teorije grupa u teoriji glazbe ili kako smjestiti Beethovena na torus, math.e, 25 (2014), 18-35, (`http://e.math.hr/broj_25/Karaga`)

[3] S. Roman, Fundamentals of Group Theory, An Advanced Approach, New York, 2012.